

Altri sintomi comuni dopo la vaccinazione possono essere la sonnolenza, l'inappetenza o la comparsa di un piccolo indurimento nel punto di iniezione. Si tratta generalmente di disturbi transitori e di modesta entità che si risolvono spontaneamente.

Nelle ore e nei giorni successivi alla vaccinazione si consiglia di mantenere le normali abitudini di vita del bambino che:

- può essere regolarmente allattato o alimentato
- può fare il bagnetto
- può prendere il ciuccio per tranquillizzarsi
- può viaggiare tenendo conto che per la maggior parte delle vaccinazioni la reazione febbrile si può manifestare entro le prime 24/48 ore dopo la somministrazione.



**PROTEGGI UN BAMBINO  
PROTEGGILI TUTTI**  
**I VACCINI SALVANO LA VITA**

## **DOPO LA VACCINAZIONE QUALCHE CONSIGLIO UTILE**

**SE IL BAMBINO CONTINUA  
AD AVERE FEBBRE O  
IRREQUIETEZZA PER  
OLTRE 24 H O SE  
PRESENTASSE SINTOMI  
INSOLITI, CONSULTARE IL  
PEDIATRA O IL PRONTO  
SOCCORSO.**

### Fonti bibliografiche

Ministero della Salute  
Direzione Generale Welfare Regione Lombardia  
AIFA  
OMS  
Schede tecniche vaccini





**Dopo la vaccinazione i genitori possono avere dei dubbi su cosa fare se il bambino presenta dei disturbi.**

**In questo opuscolo sono riportate le risposte alle domande più frequenti.**

### **Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto: cosa devo fare?**

Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti o presentare pianto insistente, ciò può essere dovuto al dolore nella sede dell'iniezione o a malessere talvolta anche in assenza di febbre. In questi casi è utile somministrare, come farmaco di prima scelta, il Paracetamolo il cui dosaggio varia in base al peso del bambino ed aiuta a ridurre sia il dolore che la febbre. Non utilizzare il farmaco a dosaggi superiori a quelli indicati sulla confezione. Non somministrare aspirina perché potrebbe causare effetti collaterali importanti.

Per l'eventuale impiego di altri antipiretici/antidolorifici (es. l'ibuprofene) e, nei rari casi di intolleranza o ipersensibilità al paracetamolo, è consigliabile consultare preventivamente il pediatra di fiducia.

### **La gamba (o il braccio) del mio bambino è calda, gonfia ed arrossata: cosa devo fare?**

Nel punto dell'iniezione la gamba (o il braccio) può arrossarsi e/o gonfiarsi. Per alleviare il fastidio è sufficiente applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolente ed infiammata o stendere una crema lenitiva. Non massaggiare. Se si ritiene che il piccolo abbia dolore intenso si può somministrare Paracetamolo.

### **Penso che il bambino abbia la febbre: cosa devo fare?**

Se dopo la vaccinazione il bambino appare caldo ed arrossato, rilevare la temperatura. Se il piccolo ha la febbre:

- aumentare l'idratazione
- evitare di coprirlo eccessivamente
- fare un bagno in acqua tiepida (non fredda) o applicare panni umidi su polsi e fronte
- somministrare Paracetamolo se la temperatura supera i 38° C.

Con la vaccinazione anti Morbillo-Parotite-Rosolia, possono comparire a distanza di 5-12 giorni: febbre, esantema, ingrossamento dei linfonodi o delle ghiandole salivari: non c'è alcun pericolo di contagio. Se il vaccino somministrato contiene la componente contro la varicella può comparire, molto raramente, entro i 30 giorni successivi, un rash cutaneo caratterizzato dalle classiche vescicole.

Dopo questa vaccinazione occorre evitare il contatto stretto tra soggetti vaccinati e soggetti suscettibili ad alto rischio (donne in gravidanza e soggetti immunocompromessi) fino a 6 settimane dopo la vaccinazione, in particolare nel caso di comparsa di pustole che, pertanto, vanno tenute coperte mediante garze.

### **Il mio bambino ha assunto il vaccino per il Rotavirus, ha avuto mal di pancia e diarrea: cosa devo fare?**

Dopo questo vaccino i bambini possono mostrare irritabilità, perdita di appetito, febbre, diarrea o stipsi che solitamente si risolvono entro le 48 h. Esiste però, in rari casi, il rischio di invaginazione intestinale che si può verificare entro 30 giorni dalla vaccinazione: in caso di pianto inconsolabile, dolore addominale severo, vomito persistente, sangue nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre si raccomanda un controllo clinico immediato presso il pediatra di fiducia o presso il Pronto Soccorso ospedaliero.

Nei 10/14 giorni successivi alla vaccinazione è opportuno effettuare un accurato lavaggio delle mani dopo il cambio del pannolino e ogni qualvolta si venga in contatto con le feci del bambino.

