



CURVA GLICEMICA – Arabo

منحنى نسبة السكر

: منحنى نسبة السكر في الدم الحمل هو اختبار يستخدم ل

- تشخيص مرض السكري: الفحص يتكون من قياس قيم الجلوكوز الصيام وبعد ساعتين من تناول محلول الجلوكوز عن طريق الفم .
- لصيام، بعد ساعة واحدة وساعتين بعد تناول محلول (3 فحص سكري الحمل: في هذه الحالة تكون السحوبات (الجلوكوز

: كيف يعمل امتحان

. تؤخذ العينة الأولى التي يتم قياس الجلوكوز الصيام بها

. غرام من السكر 57 يدعى المريض إلى شرب محلول الجلوكوز يتكون من الماء و

. 2 ساعة مرة واحدة يتم اتخاذ الحل، ويتكرر اختبار الدم بعد

. في حالة فحص مرض السكري الحلمي، يتم إجراء عينة ثالثة بعد ساعة واحدة أكثر

ساعة القادمة، وقال انه لا يمكن 2 بعد أخذ محلول الجلوكوز، والمريض لا يمكن أن تأكل، والشراب والمشى لمدة NB. إلا الحصول على ما يصل إلى

. أخذ العينة

. والدوخة... (يجب على المريض إبلاغ موظفي الرعاية الصحية، في حالة المرض (الغثيان، والتقيؤ

. في أي حال من الأحوال ينبغي للمريض الابتعاد عن غرفة أخذ العينات